

血液製剤の使用指針 V新鮮凍結血漿の適正使用 新旧対照表

項目	改定案	現行
V 新鮮凍結血漿の適正使用 7. 使用上の注意点	<p>1) 使用法</p> <p>新鮮凍結血漿を輸血する場合には、輸血セットを使用する。使用時には 30~37°C の恒温槽中で融解し、融解後直ちに必要量を輸血する。<u>直ちに使用できない場合は、2~6°C で保存し、融解後 24 時間以内に使用すること。</u>融解後 24 時間の保存により血液凝固第VIII因子の活性は約 3~4 割低下するが、<u>その他</u>の凝固因子等の活性に大きな変化は認められない。なお、2~6°C で保存した本剤の急速大量輸血、新生児交換輸血等の場合は、<u>体温の低下や血圧低下、不整脈等があらわれることがある。</u></p> <p>なお、製剤ラベルの剥脱を避けるとともに、バッグ破損による細菌汚染を起こす可能性を考慮して、必ずビニール袋に入れる。</p>	<p>1) 使用法</p> <p>新鮮凍結血漿を輸血する場合には、<u>ろ過装置を具備した輸血用器具（輸血セット）</u>を使用する。使用時には 30~37°C の恒温槽中で融解し、<u>融解後 3 時間以内に必要量を輸血する。</u></p> <p>なお、製剤ラベルの剥脱を避けるとともに、バッグ破損による細菌汚染を起こす可能性を考慮して、必ずビニール袋に入れる。</p>